

ÁCIDO ZOLEDRÔNICO

Conhecido como Aclasta, Zometa

Aliria

Para quê ele é usado?



Osteoporose

Osteopenia

Prevenção de fraturas

Doença de Paget do Osso

Qual é minha dose?

Comprimido

Cápsula

Líquido

Outro:

Dosagem: 5mg

Nº de doses: Única


Frequência: Anual

Como eu uso?



Aplicação via
intravenosa

E se eu esquecer uma dose?



Entre em contato com a seu médico ou hospital para reagendar o mais rápido possível

Já pode passar para a próxima

Posso tomar outros medicamentos?

Fale com a gente, com outro farmacêutico ou com seu médico sobre **todos os medicamentos ou tratamentos** que você esteja utilizando, incluindo vitaminas, produtos fitoterápicos e até drogas recreativas.

Conta para gente, ou para sua equipe de saúde se você tem

- Hipocalemia
- Problema nas articulações
- Deficiência de vitamina D
- Problemas orais
- Problema nos rins
- Problema no intestino
- Desidratação

Possíveis eventos adversos

Legenda: Ações recomendadas

- Fale com o médico se tiver incomodando
- Precisa falar com o médico
- Fale com o médico imediatamente
- Pare de tomar e comunique imediatamente ao médico

Eventos adversos **comuns** 1 em cada 10 pessoas podem apresentar



Febre e calafrios



Sintomas de gripe



Diarréia



Enjoos e vômito



Dores no corpo

Possíveis eventos adversos

Legenda: Ações recomendadas

- 1 Fale com o médico se tiver incomodando
- 2 Precisa falar com o médico
- 3 Fale com o médico imediatamente
- 4 Pare de tomar e comunique imediatamente ao médico

Eventos adversos incomuns

1 em cada 100 pessoas podem apresentar



Alterações nos olhos




Problemas na boca / dentes



Reações alérgicas graves



Alterações cardíacas



Alterações renais



Coisas importantes para estar atento (a)



Faça todos os exames solicitados pela sua equipe de saúde. Avise sua equipe de saúde se você tem hipocalcemia, deficiência de vitamina D, problema renal, problemas orais, se você removeu as paratireoides ou tireoide, removeu intestino, problemas nas articulações, desidratação



Se você fizer algum tratamento odontológico, avise seu dentista que está usando este medicamento



Tome bastante líquido antes e após a aplicação

Como armazenar esse medicamento?



Guardar em temperatura ambiente.

Fechado.

Após aberto deve ser usado imediatamente