

# DIMETILSULFÓXIDO DE TRAMETINIBE

Conhecido como Mekinist

Aliria

## Para quê ele é usado?



Câncer de pele



Câncer no pulmão



Câncer na tireoide

## Qual é minha dose?

Comprimido     Cápsula     Líquido     Outro:

Dosagem: 2mg

Nº de doses ao dia: 1x


Frequência: contínuo

Notas:


## Como eu tomo?




Tomar o comprimido, inteiro, com um copo de água, 1 hora antes ou 2 horas após a refeição



## E se eu esquecer uma dose?



Se a dose perdida estiver com atraso menor que 12 horas, tome-a assim que lembrar



Se a dose perdida estiver com atraso maior que 12 horas, pule esta dose e tome a próxima dose no horário certo. E, então, siga tomando seus comprimidos nos horários regulares habituais.

Já pode passar para a próxima

## Posso tomar outros medicamentos?

Fale com a gente, com outro farmacêutico ou com seu médico sobre **todos os medicamentos ou tratamentos** que você esteja utilizando, incluindo vitaminas, produtos fitoterápicos e até drogas recreativas.

## Conta para gente se tiver...

Problemas cardíacos

Algum problema nos olhos/visão

Medicamento

Medicamento

Medicamento

## Possíveis eventos adversos

### Legenda: Ações recomendadas

Fale com o médico se tiver incomodando

Precisa falar com o médico

Fale com o médico imediatamente

Pare de tomar e comunique imediatamente ao médico

Eventos adversos comuns 1 em cada 10 pessoas podem apresentar



Dificuldade de respirar



Inchaço face, língua, garganta



Alteração na visão



Dores estômago, náuseas



Alterações cardíacas

Já pode passar para a próxima

